

Широкая линейка вакцин для мелких домашних животных: защита самых ценных отношений




Защищая крепкие отношения

В течение всей жизни Вашему домашнему любимцу необходима защита от инфекций. ООО Интервет/MSD Animal Health, благодаря передовым технологиям в производстве вакцин и высочайшему их качеству, является мировым лидером в создании защиты от инфекций мелких домашних животных. Серия Нобивак® – это широкий ассортимент вакцин для каждого питомца. Вакцины Нобивак® позволяют подобрать оптимальную схему защиты Вашего любимца в любой период его жизни. Нобивак® – это не только широкий диапазон защиты, но также консультационные услуги ветеринарным врачам, заводчикам и владельцам животных по вопросам вакцинации и профилактики инфекционных заболеваний мелких домашних животных.



Nobivac: Bb



ЗАЩИТА ОТ BORDETELLA BRONCHISEPTICA

- Единственная вакцина, защищающая от основного бактериального возбудителя респираторных заболеваний кошек
- Единственная интраназальная вакцина с доказанной защитой в течение одного года
- Может использоваться с 4-х недельного возраста
- Введение в одну ноздрю
- Быстрое развитие иммунитета – спустя 72 часа после вакцинации
- Вакцина стимулирует местный (предотвращает заражение) и общий (предотвращает развитие заболевания) иммунитет

Обозначения

Основная вакцинация

Не основная вакцинация

Живая вакцина

Инактивированная вакцина

Длительность иммунитета



Nobivac Tricat Trio



Кошки



Основная



Живая



3 года

ОСНОВНАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ КОШЕК

- Вакцинация против калицивируса кошек (FCV), вируса герпеса кошек (инфекционного ринотрахеита) типа 1 (FHV-1) и вируса панлейкопении кошек (FPLV)
- Высокоэффективные живые ослабленные штаммы
- Безадьювантная вакцина
- 3-х летний иммунитет от заражения панлейкопенией
- Снижение клинических проявлений герпесвирусной инфекции (FHV-1) и калицивируса кошек (FCV) в течение 3-х лет после вакцинации
- Максимальная защита от FCV – 87,5% перекрестной нейтрализации полевых штаммов FCV *




Nobivac:Forcat

 Кошки

 Основная

 Живая

 1 и 3 года

ОСНОВНАЯ ВАКЦИНА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ХЛАМИДИОЗА

- Испытанная и подтвержденная эффективность Нобивак® Tricat плюс иммунитет к *Chlamydophila felis*
- 3-х летний иммунитет от заражения панлейкопенией кошек
- Может применяться для иммунизации котят с 6-и недель жизни
- Безадьювантная вакцина
- Максимальная защита от FCV – 87,5% перекрестной нейтрализации полевых штаммов FCV *

* Porter C.J., Radford A.D., Gaskell R.M., Ryvar R., Coyne K.P., Pinchbeck G.L., Dawson S. (2008), Comparison of the ability of feline calicivirus (FCV) vaccines to neutralise a panel of current UK FCV isolates, Journal of Feline Medicine and Surgery, 10, 32-40



Nobivac: Rabies



Кошки Собаки



Основная



Инактивированная







3 года

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ БЕШЕНСТВА В МИРЕ

- Доказанный 3-х летний иммунитет
- Широко используется в качестве вакцины выбора в рамках многих национальных и региональных программ контроля бешенства
- Может применяться вместе с другими вакцинами Нобивак®
- Используется в антирабической программе Серенгети, которая позволила существенно уменьшить число случаев заражения бешенством как среди собак, так и среди диких животных

ПРОТОКОЛ ВАКЦИНАЦИИ КОШЕК

	Основная вакцинация для кошек: FHV-1, FCV и FPLV (калицивирус, герпесвирус тип 1, панлейкопения)	+ Bb (+ <i>Bordetella bronchiseptica</i>)	+ <i>C.felis</i> (хламидиоз)	+ Бешенство
	 Tricat Trio	 Bb	 Forcat	 Rabies
4 нед.		X		
6 нед.			X	
8-9 нед.	X		X	(X)
12 нед.	X		X	X
16 нед.	(XX)		(XX)	
1-й год	X	X	X	X
2-й год		X	X	
3-й год		X	X	
4-й год	X	X	X	X
5-й год		X	X	
6-й год		X	X	
7-й год	X	X	X	X
8-й год		X	X	

(X) – возможна вакцинация в случае неблагоприятной эпизоотической ситуации с обязательной ревакцинацией в 3-х месячном возрасте

(XX) – возможна дополнительная вакцинация при наличии высокого титра материнских антител (при вскармливании котенка более 9-ти недель жизни).