

**Стоимость анестезии у животных.** Включает осмотр, подготовка к анестезии, установка в/в катетера, премедикация, сама анестезия (наркоз), сопровождение во время и после наркоза, аппаратное мониторирование, все препараты и расходные материалы. \*\*\*

|   | До 5 кг. | 5-10 кг | 10-20 кг | 20-30 кг | 30-40 кг | Свыше 40 кг |
|---|----------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| <b>1</b> степень анестезиологического риска | 1100     | 1350    | 1700     | 2000     | 2350     | 2700        |
| <b>2</b> степень анестезиологического риска | 1350     | 1500    | 1850     | 2150     | 2500     | 2850        |
| <b>3</b> степень анестезиологического риска | 1500     | 1650    | 2000     | 2300     | 2650     | 3000        |
| <b>4</b> степень анестезиологического риска | 1950     | 2100    | 2450     | 2750     | 3150     | 3600        |
| <b>5</b> степень анестезиологического риска | 2300     | 2450    | 2800     | 3200     | 3600     | 4000        |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>1 степень</b> | Общее состояние очень хорошее. Ампутация прибылых пальцев, купирование хвоста, ушей при отсутствии патологий.   |
| <b>2 степень</b> | Общее состояние хорошее. Пациент с минимальными нарушениями общего состояния. Новообразования кожи, переломы без шока, неосложненные грыжи брюшной стенки   |
| <b>3 степень</b> | Общее состояние удовлетворительное. Пациент с тяжелым заболеванием. Лихорадка, анемия, дегидратация, гиповолемия средней степени. Опухоли молочных желез, энтеротомия, цистотомия, гастротомия                                |
| <b>4 степень</b> | Общее состояние тяжелое. Угрожающее жизни заболевание (без хирургического вмешательства наступает смерть) Сепсис, тяжелая лихорадка, разрыв мочевого пузыря, разрыв диафрагмы, разрыв кишечника, пневмоторакс средней тяжести |
| <b>5 степень</b> | Общее состояние очень тяжелое. Тяжелые, опасные для жизни органические и системные нарушения. Шоковые состояния, тяжелая травма, агония. Заворот желудка, прогрессирующий шок, внутреннее кровотечение, тяжелый пневмоторакс  |

\*\*\* Степень анестезиологического риска определяет врач!